



**BONACA®**

## **TÖKÉLETES PARTNER A GYOMIRTÁSBAN**

A Bonaca® egy rendkívül hatékony posztemergens gyomirtó szer őszi búzában és őszi árpában. A készítmény gyors és tartós védelmet nyújt a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen. Tavaszi alkalmazása során a növények 2-4 leveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig maximális hatékonyságot biztosít. Más kalászos gyomirtók hatását kiegészítve és megerősítve remek kombinációs partnerként támogatja a gyommentes állomány elérését.

***KITE***

| BONACA® GYOMIRTÓ SZER  |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hatóanyag              | 250 g/l fluroxipir (360 g/l fluroxipil-meptil)                               |
| Hatóanyagcsoport       | piridiloxil-alkán-karbonsavak                                                |
| Formuláció             | (EC) emulzióképző koncentrátum                                               |
| Engedélyezett kultúrák | őszi búza, őszi árpa                                                         |
| Károsító               | magról kelő kétszikű gyomnövények, apró szulák, sövényeszulák, hamvas szeder |
| Engedélyezett dózis    | 0,6-0,8 l/ha                                                                 |
| Maximális kezelés      | 1 alkalom/vegetációs időszak                                                 |
| Permetlémmennyiség     | 200-300 l/ha                                                                 |
| Forgalmazási kategória | I.                                                                           |
| Eltarthatósági idő     | 3 év                                                                         |

### A Bonaca® gyomirtó szer előnyei:

- **Hatékony gyomirtás** – gyors és tartós hatás, ragadós galaj és apró szulák elleni kimagasló hatékonyság.
- **Rugalmas felhasználási idő** – a kultúrnövény valódi 2 leveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig.
- **Nincs utóvetemény hatás** – normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának.
- **Kiváló kombinációs partner**, mely kereskedelmi csomagban is elérhető!

### Alkalmazási javaslatok:

A Bonaca® gyomirtó tavaszi posztemergens alkalmazása akkor javasolt, amikor a hőmérséklet meghaladja a +10 °C-ot, így biztosítva a készítmény optimális hatékonyságát. Őszi búzában és őszi árpában tavaszszal, posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni 0,6-0,8 l/ha dózisban.

*Ha a készítménnyel kezelt kultúra kipusztul, akkor a kezelést követő minimum 5 hét elteltével vethető kalászos, kukorica, repce és mák, 10 hét elteltével lucerna, napraforgó, szója, paradicsom, len, káposzta, fejessaláta és spenót és 15 hét után minden más érzékeny kultúra: borsó, bab és lóhere. A kezelt területen gumós és gyökérzöldségek utóveteményként sem kerülhetnek!*

**A Bonaca gyártója:** Galenika-Fitofarmacija a.d.

**Engedélyokirat tulajdonosa:** Galenika-Fitofarmacija d.o.o.

A szórólapon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szaktanácsnak. A növényvédő szerek felhasználása kizárólag a biztonsági előírások betartásával és az engedélyokiratban foglaltak szerint történhet!  
Kérjük, mindig kövesse a címkén leírt figyelmeztetéseket és felhasználási útmutatót!

*Kérdéseivel forduljon bizalommal a KITE munkatársaihoz!*

Telefon: 54/480-401

[www.kite.hu](http://www.kite.hu)

**KITE**